Het OOG wil ook wat

IK HOOR JE

IK ZIE JE

Als doktersassistent zie jij elke dag hoe belangrijk het is om écht te luisteren. Om die ene blik op te merken. Die twijfel in iemands stem te horen. Jouw aandacht maakt het verschil, voor de patiënt en het team.

Kom naar het NVDA Kennisfestival op 7 maart 2026 in congrescentrum 1931 in 's-Hertogenbosch en laat je inspireren door sprekers die weten wat jouw werk betekent. Tijdens het kennisfestival delen inspirerende sprekers hun verhalen, kennis en ervaring. Herkenbaar, motiverend en direct toepasbaar in jouw dagelijkse praktijk. Met een groot aantal sprekers stel jij je eigen dagprogramma samen.

AANMELDEN

15.00-16.00	15.00 - 16.00	15.00-16.00	15.00-16.00	15.00 - 16.00	15.00-16.00
4.1 Stap voor stap bouwen aan een gezonde leefstijl	**4.2 Seksuele gezondheid**	**4.3 Het oog wil ook wat**	**4.4 Omgaan met lastig gedrag**	**4.5 Energiek in je werk!**	**4.6 Vrouwenspreekuur opzetten**
Dokter Elise	Sajjad Willems en Alie van der Heide	Ruud van der Pol	Paul Ram	Peter Krom	Noraly Heshof
MASTERCLASS	WORKSHOP	WORKSHOP	WORKSHOP	WORKSHOP	WORKSHOP

Het OOG wil ook wat

Wie staat er voor u?

- Ruud van der Pol
- Oogarts sinds 1999
- Alrijne ziekenhuis (opleider/KK/stafvoorzitter)
- Rijnzicht Oogkliniek (refractiechirurgie, tot 2018)
- Boerhaave nascholing (TTT, communicatie)
- Eye Care Academy
- Sint Maarten / SMMC
- St. Leer Anderen Helpen (SLAH) / Eye Care Foundation
- Oogcentrum Rembrandt
- Getrouwd met Nathalie Delfos, infectioloog
- Samengesteld gezin (3 kids), Leiden



rvanderpol@alrijne.nl

Programma

- Anatomie
- Visus & klachten
- Hordeolum & chalazion
- Rood oog & trauma

Format

- Plenaire vragen (stemmen met handen, ook tussendoor….)
- Basis
- Enkele ziektebeelden
- Vragen / interactie !!

Graag vragen en opmerkingen tussendoor,
we doen dit SAMEN!

Literatuur

NHG-Behandelrichtlijn
Hordeolum en chalazion

Auteur(s):
De Jongh E, Van der Weele GM, Verduijn MM

2023

Versie 1.1, juni 2023

NHG-Standaard
Visusklachten (M12)

NHG-werkgroep::
Blom GH, Van der Pol BAE, Soeters I, Dukker NGJ, Heus P, Morshuis-Kottink M, Oltheten JMT, Rhebergen ML, Van Zanten JLH, Eizenga WH, Wiersma Tj

2015

Versie 3.0, oktober 2015

NHG-Standaard
Rood oog en oogtrauma (M57)

NHG-werkgroep::
Bolsius EJM, De Jongh, E, Larsen-Bakker IM, Rietveld RP, Tellegen E, Van der Weele GM, Wouda PJ.

2024

Versie 2.2, september 2024

www.oogartsen.nl





Anatomie



VRAAG

Hoe lang is een gemiddeld oog?



- Langer dan 25 millimeter
- Korter dan 25 millimeter

Anatomie


Retina
Choroid
Ciliary body
Cornea
Iris
Lens
Aqueous body
Sclera
Vitreous body
Optic nerve
Optic disc area



Anatomie oogleden





Anatomie voorsegment







Anatomie achtersegment







Take home message

- Oog is klein maar fijn
- Visueel vak
- Apart orgaan met aparte ziektebeelden



Vragen?



Intermezzo: kunt u multitasken?

Wilt u klaarleggen:

- Telefoon (STOPWATCH)
- Papier
- Pen

M U L T I T A S K E N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Leg telefoon lekker weg,
U doet uzelf (en mij) een groot plezier,
DANK !!

Visus & klachten

VRAAG

Als iemand -1 is, wat is de visus dan zónder bril?



- Visus zonder bril is dan rond 80%
- Visus zonder bril is dan rond 60%

Sferisch (+/-)

- Bijziendheid / myopie groeiend probleem
- Smartphone en minder buiten
- Preventie van ziekte !



Cylinder / astigmatisme

Corneaal of lenticulair ?



Hoornvlies

of lens?

Presbyopie

- Leesadditie toenemend vanaf 44 jaar
- Dit loopt op van +1 tot +3

(Diagnostisch) refractioneren niet voor huisarts,
Opticien is hier veel beter in !



Andere “visus”testen



- Amsler test

- Donders test



- Pupilreacties

Amblyopie

- Meestal 1 oog
- Meestal door refractie en/of strabismus
- Via jeugdarts
- Tijdige en langdurige behandeling orthoptiste

Visus & klachten > 65 jaar

Veel voorkomende oogaandoeningen:

- Glasvochttroebeling / -loslating
- Cataract
- Maculadegeneratie
- Glaucoom
- Diabetische retinopathie

VRAAG

Wat is een alarmsymptoom bij mouches ?



- Paar mouches
- Veel kleine mouches
- Lichtflitsen

Flitsen & vlekken

Mechanisme

- Normale fysiologie
- 50 – 75 jaar



Flitsen & vlekken

Wanneer insturen?



Met name bij een plotse toename….
Ook zonder lichtflitsen!

Glasvocht troebeling en -loslating







Glasvocht- en netvlies loslating









Andere visuele symptomen: migraine



Cataract klachten

- Visusdaling
- Glare / verblinding
- Kleur / contrastverlies
- Myopisatie



Mooie Monet…..



Soorten cataract

- Nucleair
- Corticaal
- Subcapsularis
- Polaris
- Mengvormen



Moderne staaroperatie

Risico’s phaco…..

- Kapselruptuur
- Zonulolysis
- Irisprolaps
- Corneadecompensatie
- Glaucoom
- Cystoid macula oedeem
- Endopthalmitis (1:2000)
- En nog veel meer ……

Ongeveer 1-2%

Welke lenzen / IOLs?

- Normale lens
- Torische lens
- Enhanced depth of focus (EDOF)
- Multifocale lens
- Accomoderende lens ….

Bijbetaling voor speciale lenzen
500 – 1700 euro

Maculadegeneratie

- Droge maculadegeneratie (90%)
  - Welk soort drusen (hard/zacht)
  - Geografisch
- Exsudatieve maculadegeneratie



Onder nat altijd droge AMD!



Geografische atrofie (ook bij droog…)



Verschijnselen maculadegeneratie

- Visusdaling
  - Langzaam bij droge LMD
  - Acuut bij natte LMD
- Metamorfopsie (!!)
- Contrastgevoeligheidsdaling
- Scotoom



Risicofactoren maculadegeneratie

- Leeftijd
- Genetische aanleg
- Hart- en vaatziekten
- Ras
- Oogheelkundige factoren (mn exsudatief)
- Omgevingsfactoren:
  - Voeding
  - Roken



Welke behandelingen?



Droog & Exsudatief:

- Roken stoppen
- AREDS2 vitamines
- Instructie / Amsler

Exsudatieve maculadegeneratie:

- VEGF (bevacuzimab etc……) - Treat & Extend !
- Photo Dynamische Therapie

Intravitreale injectie



Voor en na 3 injecties Bevacuzimab



Visus voor 0.3+

(ETDRS 63)



Visus na 4 mnd 0.6+

(ETDRS 72)

VRAAG



Een staaroperatie is therapeutisch voor glaucoom?

- Voor open kamerhoek glaucoom
- Voor gesloten kamerhoek glaucoom
- Klopt niet !

Glaucoom

Progressieve opticus neuropathie met karakteristieke papilafwijkingen



De (verhoogde) oogdruk is de belangrijkste risicofactor

Papilexcavatie



Klinische anatomie van het oog en glaucoom

episclerale plexus: ontvangt het kamerwater via de watervenen van het kanaal van Schlemm

uvea met corpus ciliare: produceert kamerwater en bevat m. ciliaris die trabeculum kan opentrekken

kanaal van Schlemm: loopt direct buiten de cornearand rond

retina: axonen van de ganglioncellen vormen de zenuwvezellaag en de oogzenuw

uvea met iris: bepaalt pupilgrootte

kamerhoek: 90% afvoer via trabeculum en 10% via uvea; wordt bij nauwekamerhoek-glaucoom door de iris dichtgedrukt

oogzenuw: door glaucoom dunnen de 1,2 miljoen zenuwvezels uit met bijpassend gezichtsvelduitval

trabeculum: vernauwde zeefgaatjes bij open-kamerhoekglaucoom en steroïdglaucoom

cornea: wordt dof bij acuut glaucoom

papil: discus met centrale cup met vaten; cup/disc ratio stijgt bij glaucoom en aangeboren relatief grote discus

pupil: hierdoor stroomt kamerwater van de achterste naar de voorste oogkamer; nauwe pupil: iris trekt kamerhoek open; wijde pupil: iris kan op trabeculum drukken; midwijde pupil (schemer en opwinding): iris duwt het stevigst tegen lens aan met kans op afsluitend pupilblok

Riny Luiten MD

Welke cellen gaan er precies kapot?

Retinale ganglion cellen





Cup disc ratio







D S R K N
C K Z O H
O N R K D
K Z V D C
V S H Z O
H D K C R
C S R H N
S V Z D K

Glaucoom is sluipend – merk je zelf pas laat !

Primair open kamerhoek glaucoom

- Oorzaak onbekend
- 2% van de blanke bevolking boven de 40
- Slechts de helft weet het !!
- Verschillen per ras
- Chronisch progressief
- Beide ogen
- Vele risicofactoren

Nauwe kamerhoek glaucoom



Nauwe kamerhoek glaucoom

- Azië, Zuid Amerika
- Hypermetropie
- Chronisch (intermitterend)
- Acuut glaucoom

Symptomen acuut glaucoom

- Pijn (boven oog)
- Kringen om lampen (halo’s)
- Doffe cornea
- (geringe) waas bij kijken
- Roodheid
- Midwijde pupil
- Misselijk / braken



Behandelingen

Verlaag aanmaak kamerwater
en/of verhoog afvoer

Afh. van oorzaak !!

- Druppeltherapie (1-2-3, mn timololum en prostaglandine)
- Laser (SLT, ALT, PI)
- Phaco
- Glaucoomoperatie (fibroseremmers)
- Glaucoom implant

Diabetische retinopathie

- Geen diabetische retinopathie
- Nonproliferatief
  - Gering/matig/ernstig/zeer ernstig
- Proliferatief
  - Niet high risk/high risk/ zeer high risk
  - Gering/matig/ernstig/zeer ernstig
- Klinisch significant macula oedeem (los van bovenstaande)

Voor screening is 45° fundusfotografie van twee velden per oog een goede methode, bij voorkeur zwart-witfoto’s gemaakt met een roodvrij filter.

Een tweede goede methode is biomicroscopie in mydriasis, eventueel in combinatie
met indirecte funduscopie.

DM de novo

Diagnose diabetes	Actie
Volwassenen met de diagnose diabetes type 1 of 2	Start screening binnen 3 maanden na de diagnose diabetes type 1 of 2
Volwassenen met andere vormen van diabetes mellitus (LADA, MODY, mitochondriale diabetes, pancreasaandoeningen etc)	Start screening binnen 3 maanden na de diagnose diabetes mellitus
Vrouwen met bestaande diabetes mellitus, bij zwangerschap	Start screening bij eerste zwangerschapscontrole (zie aparte aanbeveling)
Vrouwen met zwangerschapsdiabetes (diabetes gravidarum)	Geen screening

Vervolg screening

Uitslag screening(en)	Nieuw screeningsinterval
Eenmaal geen zichtbare retinopathie (R0)	tweejaarlijks
Tweemaal achtereen geen zichtbare retinopathie (R0)	driejaarlijks
Milde (achtergrond) retinopathie (R1)	jaarlijks
Milde (achtergrond) retinopathie (R1) in beide ogen, of visusbedreigende retinopathie (R2, R3, M1)	Verwijzing naar oogarts

Niet proliferatieve DRP

Licht



Matig





Proliferatieve diabetische retinopathie



Diabetische macula - oedeem (lekkage in de gele vlek)





Welke behandelingen?
ev. na FAG

- Regulatie DM, RR en cholesterol (lange termijn en niet te snel)
- Roken stoppen
- Laser
  - Focaal
  - Panretinaal
- VEGF (bevacuzimab / aflibercept etc.)
- Vitrectomie

Alarmsymptomen Visus

Neem contact op met oogarts bij:

- Acute visusdaling
- Plotselinge uitval van een deel van het gezichtsveld
- Acuut dubbelzien

Vragen

- Aard ? Flitsen / mouches ?
- Welk oog / ogen ?
- Wanneer ?
- Progressie ?
- Trauma, oogoperatie, familie, medicatie

Oogklachten (inclusief trauma) Triagecriteria

u2 Spoed

- Doorboord oog
- Chemische stoffen/ logen/ zuren in het oog
- Kruit in het oog
- Pijn én braken én wazig zien
- Acuut dubbelzien met ernstige pijn en/of een afhangend ooglid
- Uitval (deel) gezichtsveld
- Acute fotofobie en hevige pijn

u4 Niet dringend

- Oogontsteking langer dan drie dagen zonder enige verbetering

u3 Dringend

- Recent ontstane pijn in en/of rond het oog
- Lichtflitsen en/of zien van meebewegende vlekken
- Corpus alienum op het oog met pijn
- Geel/ groen pussend oog
- Acuut dubbelzien zonder pijn/ geringe zeurende pijn/ matige pijn
- Wazig zien
- Oogontsteking met verergering van klachten
- Acute fotofobie

u5 Advies

- Stomp trauma zonder klachten
- Langer bestaande visusdaling
- Oogontsteking korter dan drie dagen bestaand en langer dan drie dagen bestaand met verbetering

Oogklachten (inclusief trauma) Vragen

u3 u2	Is er verwonding aan het oog? Kunt u die beschrijven (waardoor veroorzaakt, kracht van het letsel, oog doorboord)?
u2	Wat is er in het oog gekomen?
u2	Heeft u kruit in het oog gekregen? Kunt u het oog nog openen? Is de pupil nog rond?
u3 u2	Heeft u pijn (pijnladder)? [Pijn] Geeft u over?
u2	Ziet u dubbel? Is het plotseling ontstaan? [dubbelzien] Heeft u een afhangend ooglid?
u2	Is een gedeelte van het gezichtsveld uitgevallen?
u2	Is een gedeelte van het gezichtsveld uitgevallen?
u3 u2	Ziet u wazig of een waas die niet vermindert met knipperen?
u5 u2	Is het oog rood en/of pussend? Hoe lang bestaan de klachten?
u3	[lichtflitsen] Wat ziet u precies? Zijn het kleine friemeltjes? Zijn het flitsen die steeds weer terugkomen?
u3	Is er iets in het oog gekomen?
u5 u4 u3	Heeft u een voorwerp tegen het oog gekregen? Wat voor voorwerp? Heeft u nu nog klachten?

Alarmsymptomen

- Pijn
- Fotofobie (lichtschuwheid)
- Verminderde visus
- Acuut verhaal
- Aard trauma
- (misselijkheid, braken)
- (rood pusoog bij een zuigeling)

Take home message

- < 65e jaar meestal refractieafwijking
- > 65e jaar vaker oogaandoeningen
- Acute visusdaling, plotselinge uitval van een deel van het gezichtsveld en acuut dubbelzien zijn alarmsymptomen
- Amblyopie behandeling op jonge leeftijd
- Plotselinge toename van mouches of lichtflitsen zijn alarmsymptomen

Vragen?



Hordeolum & chalazion



VRAAG

Bij een hordeolum helpt een locaal antbioticum?



- Ja
- Nee



Hordeolum & chalazion



- Abces
- Cyste

- Internum (kliertje van Meiboom)
- Externum (kliertje van Zeiss / haarfollikel)



Differentiaal diagnose

- Chalazion
- Hordeolum
- Basaalcelcarcinoom (95% van maligne ooglidtumoren)
- Plaveiselcelcarcinoom (4%)
- Talgkliercarcinoom (1%)



Belangrijk in anamnese

- Duur
- Progressie
- Pijn
- Uitvloed

Belangrijk bij onderzoek

- Roodheid
- Pijn
- Verlies wimperharen
- Contour ooglidrand
- Ulceratie
- Visus kan wat verminderd zijn



Basaalcelcarcinoom



Chalazion





Talgkliercarcinoom



Hordeolum



Plaveiselcelcarcinoom



Conservatieve behandeling chalazion/hordeolum

- Uitleg (hordeolum meestal self limiting, chalazion 50%)
- Warme compressen (3 dd 15 min, 2 wkn)
- Verwijderen haar / puncteren kopje
- Geen antibiotica….



1e / 2e lijn chirurgisch methoden

- Intralesionaal steroid injectie
- Chalazion excochleatie



Intralesionaal
Steroid injecties

Goed afsteunen
Injecties PARALLEL aan oog
Let op diepte!





Chalazion excochleatie






Chalazion
Hordeolum (sty)
Orbital phlegmon
Basaloma
Marginal blepharitis

Incisie: haaks op tarsus / verticaal





Take home message

- Hordeolum verdwijnt meestal spontaan
- Chalazion 50% na maanden, expectatief
- Cave BCC….
- Intralesionaal steroid injecties, “eitje”



Vragen?



Rood oog & trauma

Roodheid oog

Kijk ook naar cornea,
Met FLUO!

Kijk ook naar oogleden,
bv mollusca



Fig. 4.6

Rood oog

NHG

iris
oogartsen.nl


conjunctivale hyperemie
hypopyon
oogartsen.nl


Oogaandoeningen (geen trauma)
Rood oog
Droge ogen of ooglidaandoening (soms conjunctivale roodheid)
Geen alarmsymptomen
Alarmsymptomen (pijn, fotofobie, visusverandering, misselijkheid/braken
Conjunctivale roodheid: opper-vlakkige, verschuif-bare roodheid
Sclerale roodheid: diepe, niet verschuif-bare roodheid
Conjunctivitis vaak diffuse roodheid
Infectieus
- Na geboorte < 10 dagen
VERWIJS dezelfde dag
- Herpes zoster in gelaat
VERWIJS binnen een week
- banaal
- soa
- herpes simplex
- mollusca contagiosa
Allergie (IgE gemedieerd)
Contactallergie
Mechanisch
Subconjunc-tivale bloeding scherp begrensd lakrood
Episcleritis (meestal) segmentale roodheid
Acuut glaucoom misselijk/braken, pijn en visusverandering bij rood oog
VERWIJS direct (spoed)
Uveïtis pijn, fotofobie, visusverandering bij ciliaire roodheid
Scleritis pijn bij diepe roodheid (diffuus of plaatselijk)
Keratitis pijn, fotofobie, visusdaling, conjunctivale rood-heid, aankleuring door fluoresceïne
- bij herpes zoster
- andere keratitis
VERWIJS dezelfde dag
Keratitis dendritica
Droge ogen/ keratoconjunctivitis sicca
Blefaritis
Als bij aanvullend onderzoek aanwijzingen hiervoor ontbreken: heroverweeg episcleritis of conjuctivitis

diffuse episcleritis
oogartsen.nl

oogartsen.nl

Bacterial conjunctivitis
Viral conjunctivitis
Allergic conjunctivitis
Dry eye
Subconjunctival hemorrhage

Hyposfagma



- Oppervlakkige subconjunctivale bloeding door stomp of scherp trauma
- Onschuldig
- Soms indrukwekkend
- Let op cornea

Sicca syndroom / droge ogen







Tranen zijn een symptoom
van droge ogen

Blepharitis Squamosa



Ooglidhygiëne bij blefaritis

- Verwarmen
- Massage
- Poetsen

Allergie



Bacterial conjunctivitis
Viral conjunctivitis
Allergic conjunctivitis
Dry eye
Subconjunctival hemorrhage

Adenovirus

- Conjunctivitis (onderscheid bact niet te maken)
- Keratitis





Uveitis

- Roodheid meer rondom
- Diepe roodheid, vaak limbaal
- Geen uitvloed
- Visus soms minder
- Let op fotofobie en pijn !



Keratitis

- Cave contactlenzen !!
- Roodheid meest bij laesie
- Vaak limbaal enoppervlakkig
- Weinig uitvloed
- Visus soms minder
- Let op fotofobie en pijn !







Acuut glaucoom

- Pijn (boven oog)
- Kringen om lampen (halo’s)
- Doffe cornea
- (geringe) waas bij kijken
- Roodheid
- Midwijde pupil
- Misselijk / braken



Oogtraumata - Cornea erosie



- Veel pijn, tranen, roodheid, oog moeilijk open te krijgen
- **Verdoven** met oxybuprocaine
- **Aankleuren** met fluorescine strip, blauw licht
- **Drukkend zalfverband**, chlooramfenicol

Krassen op cornea door corpus alienum





- Net als erosie
- Verschil: **Vind corpus alienum**
- Klap ooglid om

Corpus Alienum



- 9 vd 10 x metaalsplinter
- **Roest!!** Niet te verwarren met irispigmentatie
- **Oxybuprocaine**
- Verwijderen met guts of frasen/boortje
- Let op **PUPIL !!**
- Zalfverband chlooramfenicol
- Evt 1 dag later retour

Perforatie met corpus alienum

Afblijven!!!!!

Pijnstilling, dop erop,

beeldvorming,OK



Perforatie


Broken Pencil
Rupturing
Right Eye
Cross Section Through Right Eye
Broken Pencil Perforating Cornea
And Penetrating Lens Capsule
Cornea
Iris
Lens Within Lens Capsule
Anterior Chamber
Posterior Chamber


Foreign Matter
Along Wound
Track
Superonasal
Paracentral Full
Thickness Corneal
Shelved
Perforation
Fluid Leaking
From Cornea
Traumatic
Rupture Of
The Anterior
Lens Capsule

Bacterial conjunctivitis
Viral conjunctivitis
Allergic conjunctivitis
Dry eye
Subconjunctival hemorrhage

Irisprolaps na perforatie





- Pupil vervormd
- Iris komt naar buiten
- Voorste oogkamer lekt/opgeheven
- **Dop erop**
- Pijnstilling
- **Geen druppels en/of zalf**
- (Onderzoek, beeldvorming, OK)



Chemisch letsel





- Zuur of Basisch
- Ph=7
- Ph stripjes
- **Spoelen**
- **Spoelen**
- **Spoelen**
- Ook onder oogleden

- Epitheel, haze, ischaemie, oogdruk, limbus


Op SEH

Na 1 maand


Na 6 mnd

Bacterial conjunctivitis
Viral conjunctivitis
Allergic conjunctivitis
Dry eye
Subconjunctival hemorrhage

Vuurwerk

- Pneumatisch “blast” trauma
  Thermisch trauma
  Chemisch trauma (basisch)
  Scherp trauma
  Stomp mechanisch trauma
  Tatoeage trauma
  Psychisch trauma

- Oogleden
- **Kruit moet eruit!!**
- Nationale registratie
- Siervuurwerk en omstanders, mn kinderen

Hyphaem

- Bloeding voorste oogkamer uit iris
- Vloeistofspiegel
- Risico **verhoogde oogdruk**
- Steroiden, mydriasis en **Rust Rechtop**

Irisdialyse



- Iris losgescheurd van corpus ciliare
- Pupil vervormd, irisdefect bij limbus
- Meestal geen consequenties
- Oogdruk

Stomp trauma







Take home message

- Bij rood oog vraag naar alarmsymptomen
- Conjunctivitis is self limiting zonder a.b.
- Ooglidhygiëne bij blefaritis
  (verwarmen, massage en poetsen)
- Droge ogen is pappen en nathouden
- Trauma – let op verhaal !



Vragen?



Take home message OGEN

- Ogen zijn bijzonder met eigen ziektebeelden
- NHG standaarden zijn informatief en behulpzaam

Literatuur

Nederlands Huisartsen Genootschap

NHG-Behandelrichtlijn
Hordeolum en chalazion

Auteur(s):
De Jongh E, Van der Weele GM, Verduijn MM

Versie 1.1, juni 2023

Nederlands Huisartsen Genootschap

NHG-Standaard
Visusklachten (M12)

NHG-werkgroep::
Blom GH, Van der Pol BAE, Soeters I, Dukker NGJ, Heus P, Morshuis-Kottink M, Oltheten JMT, Rhebergen ML, Van Zanten JLH, Eizenga WH, Wiersma Tj

Versie 3.0, oktober 2015

Nederlands Huisartsen Genootschap

NHG-Standaard
Rood oog en oogtrauma (M57)

NHG-werkgroep::
Bolsius EJM, De Jongh, E, Larsen-Bakker IM, Rietveld RP, Tellegen E, Van der Weele GM, Wouda PJ.

Versie 2.2, september 2024

www.oogartsen.nl





Laatste vragen OGEN?

rvanderpol@alrijne.nl

Dank voor uw aandacht

rvanderpol@alrijne.nl